Dr Roman Tourolle
Chirurgien - Dentiste

18 bis route de Dijon 21121 Ahuy
Clinique Bénigne Joly 21240 Talant
03 80 23 89 88
dr.romantourolle@gmail.com

INFORMATION CHIRURGIES D'EXERESE DE KYSTES, DE TUMEURS BENIGNES OU DE BIOPSIE

Les mâchoires peuvent parfois présenter des kystes (infectieux ou embryonnaires), des tumeurs bénignes (non cancéreuses, le plus souvent appelés « odontomes ») ou des lésions des tissus mous qu'il est nécessaire de retirer et de faire analyser pour confirmer leur caractère bénin.

L'intervention peut s'effectuer sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale, en fonction du caractère invasif de l'acte (nombre de lésions, taille, proximité avec un élément anatomique noble...) et/ou du statut médical du patient (pathologie médicale, coopération, état psychologique...)

Les suites opératoires normales sont : l'œdème (gonflement des joues), la douleur, la limitation de l'ouverture de la bouche, ainsi qu'un petit saignement de quelques heures. Tout acte chirurgical, même bien mené, comporte des risques de complications immédiates ou tardives, qui doivent cependant être relativisés au regard des bénéfices attendus :

• Hématome et saignement persistant,
• Alvéolite : inflammation ou infection du site opéré,
• Cellulite : inflammation ou infection des tissus mous de la face ou de la bouche,
• Lésion d'une dent voisine, descellement d'une couronne, fracture d'une restauration dentaire, d'un bridge ou d'une dent.
• Perte ou diminution de la sensibilité de la lèvre ou de la langue, le plus souvent transitoire (quelques semaines à quelques mois), et exceptionnellement définitive.
• Fracture osseuse (notamment l'angle de la mandibule) pendant l'intervention ou pendant la phase de consolidation,
• Communication entre la bouche et le sinus qui se ferme seule le plus souvent (4 à 8 semaines). En cas de persistance, une intervention sera nécessaire pour obtenir sa fermeture.