Dr Roman Tourolle
Chirurgien - Dentiste

18 bis route de Dijon 21121 Ahuy
Clinique Bénigne Joly 21240 Talant
03 80 23 89 88
dr.romantourolle@gmail.com

INFORMATION CHIRURGIE DE GREFFE OU DE PLASTIE GINGIVALE

En cas de perte de tissu gingival ou si la gencive est trop fine on pratiquera une greffe ou une plastie gingivale. C'est une intervention préconisée pour renforcer ou stabiliser le tissu de soutien de la dent ou autour des implants. Elle est demandée pour des raisons esthétiques et fonctionnelles. Pour les greffes, le greffon est prélevé dans la gencive dans la zone du palais. Le greffon est ensuite positionné sur la zone dénudée ou à renforcer et fixé par des sutures. Pose d'une plaque palatine pour protéger le palais. L'intervention est réalisée sous anesthésie locale. La cicatrisation primaire est obtenue en 10 jours. Les fils sont alors déposés. La cicatrisation définitive et l'aspect final sont obtenus au bout de quelques mois. L'arrêt du tabac la semaine précédant l'acte opératoire et pendant le mois qui suit est indispensable.

► Tout acte chirurgical, comporte des risques de complications immédiates ou tardives, qui doivent cependant être relativisées au regard des bénéfices attendus :

• Hématome et saignement persistant,
• Cellulite : inflammation ou infection des tissus mous de la face ou de la bouche,
• Ostéite : infection osseuse du site donneur et/ou receveur,
• Perte ou diminution de la sensibilité de la lèvre ou de la langue, le plus souvent transitoire (quelques semaines à quelques mois), et exceptionnellement définitive,
• Altération de la sensibilité des dents proches du prélèvement osseux, « rigidité » transitoire des muscles du menton
• Exposition du greffon, nécrose, perte du greffon.
• Retour à la situation initiale

Les suites opératoires à envisager sont liées au décollement de la gencive au niveau du palais. Un œdème est habituel parfois associé à des ecchymoses des joues dont l'importance et la durée sont très variables d'un individu à l'autre. Les douleurs post opératoires sont aussi très variables d'un individu à l'autre. Le traitement post-opératoire comportera habituellement une hygiène buccale très stricte et un traitement anti douleur.